

Vaccin conjugué contre le méningocoque de sérotype C



« La vaccination, une bonne protection »

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre l'infection à méningocoque de sérotype C et ses complications. La méningite (infection des enveloppes du cerveau) et la méningococcémie (infection du sang) sont 2 maladies graves causées par le méningocoque. Il existe différents types (ou sérotypes) de méningocoque (A, B, C, Y, W135). Au Québec, on trouve surtout le sérotype B (contre lequel il n'y a aucun vaccin) et le sérotype C. Ce vaccin protège contre le sérotype C.

Les infections à méningocoque de sérotype C causent :

- une forte fièvre;
- un mal de tête important;
- des nausées et des vomissements;
- une atteinte de l'état général;
- des rougeurs ou de petites hémorragies de la taille d'une tête d'épingle ou des bleus sur la peau.

Les complications possibles sont :

- des dommages permanents au cerveau;
- une amputation des mains ou des pieds (10 à 15 % des cas);
- la mort (10 à 15 % des cas).

MALADIE

LE VACCIN

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre l'infection à méningocoque de sérotype C et ses complications. Au Québec, ce vaccin est donné à l'âge de 1 an. Le vaccin est aussi administré, à compter de l'âge de 2 mois, aux personnes ayant une condition qui augmente leur risque d'infection grave à méningocoque de sérotype C.

Le vaccin conjugué contre le méningocoque de sérotype C est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée. Les symptômes ressentis après la vaccination ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

Les réactions possibles au vaccin sont :

- De la douleur (50 % ou plus), de la rougeur, un gonflement (10 à 49 %) à l'endroit où l'injection a été faite.
 - De la fièvre, de la somnolence, de l'irritabilité, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, un mal de tête, un malaise, des douleurs musculaires, des douleurs aux jointures (10 à 49 %).
- La fièvre, la somnolence et l'irritabilité sont plus fréquentes chez les enfants âgés de moins de 5 ans.*
- Le mal de tête, le malaise, les douleurs musculaires et les douleurs aux jointures sont plus fréquents chez les personnes âgées de 11 ans ou plus.*

Ce qu'il faut faire :

- Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.
- Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38,5 °C ou plus.
- Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.

RÉACTIONS

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent, et la personne qui administre le vaccin peut traiter cette réaction. C'est pourquoi il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration du vaccin.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin, ou consultez Info-Santé (8-1-1) ou votre médecin.

