

Vaccin conjugué contre le pneumocoque



« La vaccination, une bonne protection »

En faisant vacciner votre enfant, vous le protégez contre les infections graves à pneumocoque et leurs complications. Il existe plusieurs types de pneumocoque. Le vaccin conjugué protège contre les 7 types (vaccin Prevnar) ou les 10 types (vaccin Synflorix) les plus fréquents chez les enfants.

	Le pneumocoque se transmet par :	Les infections à pneumocoque causent :	Les complications possibles sont :
MALADIE	<ul style="list-style-type: none"> un contact avec les sécrétions du nez et de la gorge d'une personne infectée. 	<ul style="list-style-type: none"> une otite; une sinusite; une pneumonie; une méningite (infection des enveloppes du cerveau); une bactériémie (infection du sang). 	<ul style="list-style-type: none"> la surdit�; des dommages permanents au cerveau; la mort.

LE VACCIN

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections graves causées par le pneumocoque. Le vaccin conjugué contre le pneumocoque est indiqué pour tous les enfants âgés de 2 mois à 4 ans. Le vaccin est aussi recommandé pour toutes les personnes âgées de 5 à 17 ans ayant une condition médicale qui augmente leur risque d'infection grave au pneumocoque. Le nombre de doses à recevoir varie selon l'âge et la condition médicale de la personne.

Le vaccin conjugué contre le pneumocoque est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée. Les symptômes ressentis après la vaccination ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

	Les réactions possibles au vaccin sont :	Ce qu'il faut faire :
RÉACTIONS	<ul style="list-style-type: none"> De la douleur, de la rougeur, un gonflement à l'endroit où l'injection a été faite (10 à 49 %). Une fièvre légère, de l'irritabilité (10 à 49 %) ou une fièvre élevée (1 à 9 %). Il arrive rarement qu'une forte fièvre donne des convulsions à l'enfant (1 à 9 pour 1 000). Des changements dans l'appétit et le sommeil, des vomissements, de la diarrhée (10 à 49 %), des rougeurs sur la peau (1 à 9 pour 1 000). 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite. Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38,5 °C ou plus. Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent, et la personne qui administre le vaccin peut traiter cette réaction. C'est pourquoi il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration du vaccin.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin, ou consultez Info-Santé (8-1-1) ou votre médecin.

