

# Vaccin injectable contre la typhoïde



## « La vaccination, une bonne protection »

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre la typhoïde et ses complications. Ce vaccin est indiqué pour les voyageurs qui se rendent dans des régions où le risque de transmission est jugé élevé en raison de la présence de la maladie et de conditions sanitaires inadéquates.

	La typhoïde se transmet par :	La typhoïde cause :	Les complications possibles sont :
<b>MALADIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>un contact avec de l'eau ou des aliments contaminés par les selles d'une personne infectée par la typhoïde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de la fièvre;</li> <li>un mal de tête;</li> <li>des maux de ventre;</li> <li>de la constipation;</li> <li>un pouls lent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la mort (1 % des cas traités).</li> </ul>

## LE VACCIN

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la typhoïde et ses complications. Si le risque persiste, le vaccin devrait être administré tous les 3 ans.

En plus de la vaccination, il est important d'éviter la consommation d'eau et d'aliments susceptibles d'être contaminés ainsi que d'appliquer des mesures d'hygiène simples (lavage des mains et désinfection des objets qui pourraient avoir été souillés par des selles).

Le vaccin injectable contre la typhoïde est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction indésirable. Les symptômes ressentis après la vaccination ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

	Les réactions possibles au vaccin sont :	Ce qu'il faut faire :
<b>RÉACTIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De la douleur (10 à 49 %), de la rougeur, un gonflement (1 à 9 %) à l'endroit où l'injection a été faite.</li> <li>De la fièvre, un mal de tête, un malaise, des douleurs musculaires, des nausées, des démangeaisons (1 à 9 %).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li> <li>Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38,5 °C ou plus.</li> <li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li> </ul>

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent, et la personne qui administre le vaccin peut traiter cette réaction. C'est pourquoi il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration du vaccin.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin, ou consultez Info-Santé (8-1-1) ou votre médecin.

