

# Vaccin oral contre la typhoïde



## « La vaccination, une bonne protection »

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre la typhoïde et ses complications. Ce vaccin est indiqué pour les voyageurs qui se rendent dans des régions où le risque de transmission est jugé élevé en raison de la présence de la maladie et de conditions sanitaires inadéquates.

	La typhoïde se transmet par :	La typhoïde cause :	Les complications possibles sont :
<b>MALADIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>un contact avec de l'eau ou des aliments contaminés par les selles d'une personne infectée par la typhoïde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de la fièvre;</li> <li>un mal de tête;</li> <li>des maux de ventre;</li> <li>de la constipation;</li> <li>un pouls lent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la mort (1 % des cas traités).</li> </ul>

## LE VACCIN

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la typhoïde et ses complications. On doit prendre toutes les doses du vaccin pour avoir la meilleure protection possible. Si le risque persiste, le vaccin devrait être administré tous les 7 ans.

En plus de la vaccination, il est important d'éviter la consommation d'eau et d'aliments susceptibles d'être contaminés ainsi que d'appliquer des mesures d'hygiène simples (lavage des mains et désinfection des objets qui pourraient avoir été souillés par des selles).

Le vaccin se présente sous la forme de 4 capsules qui doivent être conservées au réfrigérateur.

Le vaccin doit être pris à jeun, au moins 2 heures après un repas et 1 heure avant le repas suivant.

Le vaccin oral contre la typhoïde est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction indésirable. Les symptômes ressentis après la vaccination ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

	Les réactions possibles au vaccin sont :	Ce qu'il faut faire :
<b>RÉACTIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des vomissements, de la diarrhée, des maux de ventre, de la fièvre, un mal de tête et des rougeurs sur la peau (1 à 9 %).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38,5 °C ou plus.</li> <li>Compléter la vaccination une semaine avant le départ pour ne pas être incommodé durant le voyage.</li> <li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulter un médecin immédiatement.</li> </ul>

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin, ou consultez Info-Santé (8-1-1) ou votre médecin.

