

# Vaccin dcaT

## Vaccin combiné contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos



### « La vaccination, une bonne protection »

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et leurs complications.

#### MALADIES

Diphtérie	Coqueluche	Tétanos
<b>La diphtérie cause :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>des maux de gorge importants;</li> <li>une forte fièvre;</li> <li>des problèmes respiratoires et cardiaques.</li> </ul>	<b>La coqueluche cause :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>de violentes quintes de toux pouvant durer des mois;</li> <li>de la difficulté à manger, à boire et à respirer.</li> </ul>	<b>Le tétanos cause :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>des spasmes musculaires de la mâchoire;</li> <li>des spasmes des cordes vocales;</li> <li>des spasmes musculaires de tout le corps.</li> </ul>
<b>Les complications possibles sont :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>une paralysie;</li> <li>la mort (5 à 10 % des cas).</li> </ul>	<b>Les complications possibles sont :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>une pneumonie;</li> <li>des convulsions;</li> <li>des dommages au cerveau (1 cas pour 11 000);</li> <li>la mort (0,4 % chez les bébés).</li> </ul>	<b>Les complications possibles sont :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>la mort (10 % des cas).</li> </ul>

## LE VACCIN

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et leurs complications. Ce vaccin est administré aux personnes âgées de 7 ans ou plus qui ont besoin de protection contre ces 3 maladies. Même s'ils risquent peut-être d'avoir plus de réactions, les adolescents et certains adultes qui ont reçu un vaccin contre la diphtérie et le tétanos depuis moins de 5 ans recevront le vaccin dcaT pour être protégés contre la coqueluche.

Le vaccin combiné contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée. Les symptômes ressentis après la vaccination ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

#### RÉACTIONS

Les réactions possibles au vaccin sont :	Ce qu'il faut faire :
<ul style="list-style-type: none"> <li>De la douleur (50 % ou plus), de la rougeur, un gonflement (10 à 49 %) à l'endroit où l'injection a été faite.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Une petite bosse pendant quelques semaines à l'endroit où l'injection a été faite (1 à 9 pour 1 000).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>De la fièvre (1 à 9 %).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38,5 °C ou plus.</li> <li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Un abcès stérile à l'endroit où l'injection a été faite (1 à 9 pour 100 000).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>De la fatigue et un mal de tête (50 % ou plus), un malaise, des étourdissements, des nausées, de la diarrhée, des frissons (10 à 49 %), des vomissements (1 à 9 %).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Une douleur intense et de la faiblesse dans le bras durant plusieurs semaines (1 à 9 cas pour 100 000).</li> </ul>	

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent, et la personne qui administre le vaccin peut traiter cette réaction. C'est pourquoi il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration du vaccin.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin, ou consultez Info-Santé (8-1-1) ou votre médecin.

