

Vaccin d2T5

Vaccin combiné contre la diphtérie et le tétanos



« La vaccination, une bonne protection »

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre la diphtérie, le tétanos et leurs complications.

MALADIES

Diphtérie	Tétanos
La diphtérie cause : <ul style="list-style-type: none">des maux de gorge importants;une forte fièvre;des problèmes respiratoires et cardiaques.	Le tétanos cause : <ul style="list-style-type: none">des spasmes musculaires de la mâchoire;des spasmes des cordes vocales;des spasmes musculaires de tout le corps.
Les complications possibles sont : <ul style="list-style-type: none">une paralysie;la mort (5 à 10 % des cas).	Les complications possibles sont : <ul style="list-style-type: none">la mort (10 % des cas).

LE VACCIN

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la diphtérie, le tétanos et leurs complications. Il est recommandé de recevoir une dose de rappel du vaccin tous les 10 ans pour avoir la meilleure protection possible. Dans certaines circonstances, par exemple une plaie souillée, une dose de rappel est administrée avant ce délai.

Le vaccin combiné contre la diphtérie et le tétanos est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée. Les symptômes ressentis après la vaccination ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

RÉACTIONS

Les réactions possibles au vaccin sont :	Ce qu'il faut faire :
<ul style="list-style-type: none">De la douleur (50 % ou plus), de la rougeur, un gonflement (10 à 49 %) à l'endroit où l'injection a été faite.Une petite bosse pendant quelques semaines à l'endroit où l'injection a été faite (1 à 9 pour 1 000).De la fièvre et un malaise (1 à 9 %).Un abcès stérile à l'endroit où l'injection a été faite (1 à 9 pour 100 000).Une douleur intense et de la faiblesse dans le bras durant plusieurs semaines (1 à 9 pour 100 000).	<ul style="list-style-type: none">Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38,5 °C ou plus.Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent, et la personne qui administre le vaccin peut traiter cette réaction. C'est pourquoi il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration du vaccin.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin, ou consultez Info-Santé (8-1-1) ou votre médecin.

