

# Vaccin contre la poliomyélite



## « La vaccination, une bonne protection »

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre la poliomyélite et ses complications.

### MALADIE

#### La poliomyélite cause :

- de la fièvre;
- des nausées et des vomissements;
- un malaise;
- une paralysie des bras et des jambes (1 % des cas).

#### Les complications possibles sont :

- des problèmes respiratoires;
- une paralysie permanente (près de 50 % des cas hospitalisés);
- la mort (5 % des cas hospitalisés).

## LE VACCIN

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la poliomyélite et ses complications. Le vaccin est administré aux enfants à partir de l'âge de 2 mois. Il est habituellement combiné avec les vaccins contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et les infections graves à *Haemophilus influenzae* de type b (Hib). Ce vaccin est aussi administré aux voyageurs, quel que soit leur âge, lorsqu'ils se rendent dans des pays où il y a un risque d'exposition à la poliomyélite.

Le vaccin contre la poliomyélite est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction indésirable. Les symptômes ressentis après la vaccination ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

### RÉACTIONS

#### Les réactions possibles au vaccin sont :

- De la douleur (10 à 49 %), de la rougeur (1 à 9 %), un gonflement (1 à 9 pour 1 000) à l'endroit où l'injection a été faite.
- De la fièvre chez les enfants (10 à 49 %).

#### Ce qu'il faut faire :

- Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.
- Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38,5 °C ou plus.

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent, et la personne qui administre le vaccin peut traiter cette réaction. C'est pourquoi il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration du vaccin.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin, ou consultez Info-Santé (8-1-1) ou votre médecin.

