

Vaccin conjugué contre *Haemophilus influenzae* de type b (Hib)



« La vaccination, une bonne protection »»

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre les infections graves à *Haemophilus influenzae* de type b (Hib) et leurs complications.

MALADIES

Les infections graves à Hib causent :

- une épiglottite (une enflure importante dans la gorge);
- une pneumonie;
- une méningite.

Les complications possibles sont :

- la surdité;
- un retard mental;
- la mort (5 % des cas de méningite).

LE VACCIN

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections graves à *Haemophilus influenzae* de type b et leurs complications. Le vaccin est administré aux enfants âgés de moins de 5 ans et est habituellement combiné avec les vaccins contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite. Il est aussi administré aux personnes, quel que soit leur âge, ayant une condition médicale qui augmente leur risque d'infection grave à Hib.

Le vaccin contre *Haemophilus influenzae* de type b est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction indésirable. Les symptômes ressentis après la vaccination ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

RÉACTIONS

Les réactions possibles au vaccin sont :

- De la douleur, de la rougeur, un gonflement à l'endroit où l'injection a été faite (10 à 49 %).
- De la fièvre chez les enfants (1 à 9 %).

Ce qu'il faut faire :

- Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.
- Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38,5 °C ou plus.

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent, et la personne qui administre le vaccin peut traiter cette réaction. C'est pourquoi il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration du vaccin.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin, ou consultez Info-Santé (8-1-1) ou votre médecin.

