

# Vaccin RRO

## Vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole et les oreillons



### « La vaccination, une bonne protection »

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et leurs complications.

#### MALADIES

Rougeole	Rubéole	Oreillons
<b>La rougeole cause :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>des rougeurs;</li> <li>de la toux;</li> <li>de la fièvre;</li> <li>une conjonctivite (yeux rouges);</li> <li>une atteinte de l'état général.</li> </ul>	<b>La rubéole cause :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>des rougeurs;</li> <li>une enflure des ganglions;</li> <li>de l'arthrite (surtout chez les femmes).</li> </ul>	<b>Les oreillons causent :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>de la fièvre;</li> <li>un mal de tête;</li> <li>une enflure des glandes situées près de la mâchoire.</li> </ul>
<b>Les complications possibles sont :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>une otite (5 à 9 % des cas);</li> <li>une pneumonie (1 à 5 % des cas);</li> <li>des convulsions;</li> <li>des dommages permanents au cerveau (1 cas pour 1 000);</li> <li>la mort (1 cas pour 3 000).</li> </ul>	<b>Les complications possibles sont :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>la fausse couche chez la femme enceinte;</li> <li>des malformations chez le bébé dont la mère a fait la rubéole pendant la grossesse.</li> </ul>	<b>Les complications possibles sont :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>une méningite (10 à 30 % des cas);</li> <li>la surdit�;</li> <li>une infection des testicules;</li> <li>une infection des ovaires.</li> </ul>

## LE VACCIN

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et leurs complications. La protection dure toute la vie. Les enfants reçoivent le vaccin RRO combiné avec le vaccin contre la varicelle à l'âge de 12 mois. Puis, une 2<sup>e</sup> dose du vaccin RRO leur est donnée à l'âge de 18 mois.

Le vaccin RRO est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée. Les symptômes ressentis ne sont pas nécessairement causés par le vaccin.

Une femme qui reçoit le vaccin doit éviter de devenir enceinte au cours du mois suivant la vaccination.

#### RÉACTIONS

Les réactions possibles au vaccin sont :	Ce qu'il faut faire :
<ul style="list-style-type: none"> <li>De la douleur, de la rougeur, un gonflement à l'endroit où l'injection a été faite (1 à 9 %).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Une fièvre légère (10 à 49 %) et des rougeurs non contagieuses (1 à 9 %) entre la 5<sup>e</sup> et la 12<sup>e</sup> journée suivant la vaccination.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prendre un médicament du type acétaminophène ou ibuprofène si la température est de 38,5 °C ou plus.</li> <li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Une fièvre élevée (1 à 9 %), des frissons (1 à 9 pour 1 000), des convulsions (1 à 9 pour 10 000).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>De l'irritabilité, de la somnolence, une conjonctivite, de la diarrhée (1 à 9 %).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Des douleurs aux jointures (1 à 9 % des enfants, 10 à 49 % des adultes).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Une enflure des ganglions et des glandes situées près de la mâchoire (1 à 9 pour 1 000).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Une diminution temporaire des cellules sanguines qui aident à la coagulation du sang (1 à 9 pour 100 000).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Des problèmes neurologiques (moins de 1 pour 1 million).</li> </ul>	

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. Si une réaction allergique grave devait survenir, elle débiterait dans les minutes qui suivent, et la personne qui administre le vaccin peut traiter cette réaction. C'est pourquoi il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration du vaccin.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui administre le vaccin, ou consultez Info-Santé (8-1-1) ou votre médecin.

